Frühjahrszug | Herbstzug

Ankunft *Arrival* Wattenmeer

Art *Species*	aus Richtung *from Direction*	Anzahl *Number*	Aufenthalt *Stop-over*
Januar			
Kurzschnabelgans	Niederlande, Belgien	**15.000**	in kalten Wintern erst im Februar oder März, vorwiegend im dänischen Wattenmeer
Februar			
Spießente	Westafrika, Mittelmeer, Westeuropa	**22.000**	bis April
Kiebitz	Westeuropa	**35.000**	bis März; viele weitere brüten im Wattenmeer
Knutt	Westeuropa	**450.000**	Ankunft Februar/März, bis Anfang Mai (grönländisch/kanadische Population)
Silbermöwe	Mittel- und Westeuropa	**200.000**	bis März; viele bleiben zur Brut
März			
Kormoran	Mittel- und Westeuropa	**16.000**	bis April; viele bleiben zur Brut
Löffler	Westafrika/ Südwesteuropa	**5.000**	bleiben bis September und brüten
Nonnengans	Niederlande	**200.000**	bis Mai; mehr als 1.000 Paare bleiben zur Brut
Dunkelbäuchige Ringelgans	Küsten Frankreich, Südengland, Niederlande	**225.000**	bis Mai; die ersten kommen schon vor März
Krickente	Westeuropa	**18.000**	bis Mitte April
Löffelente	Westafrika, Südwesteuropa	**3.000**	bis April; viele bleiben zur Brut
Austernfischer	Mittel- und Westeuropa	**mehrere 10.000**	kommen zum Winterbestand dazu
Säbelschnäbler	Portugal, Westfrankreich	**21.500**	die meisten brüten im Wattenmeer und bleiben bis September oder länger
Sandregenpfeifer	Nordwestafrika, Südwesteuropa	**5.000**	bis April; 1.000 Paare bleiben zur Brut
Goldregenpfeifer	Atlantikküste Südwesteuropa	**> 50.000**	bis Anfang Mai in Salzwiesen und binnenländischen Marschen
Kiebitzregenpfeifer	Küsten Westeuropa, westliches Mittelmeer	**30.000**	bis Mai
Sanderling	Atlantikküste Westeuropa	**5.000**	bis Mai
Alpenstrandläufer	Küsten Westeuropa bis Nordafrika	**1.000.000**	bis Mai, einige kommen schon im Februar
Uferschnepfe	Westafrika, Südwesteuropa	**6.000**	bleiben bis Juli und brüten
Pfuhlschnepfe	Westeuropa	**45.000**	bis Anfang Mai (skandinavisch-russische Population)
Großer Brachvogel	Westeuropa	**25.000**	bis April; kommen zu den Überwinterern dazu; einige hundert Paare brüten
Rotschenkel	Westafrika	**30.000**	lokale Brutvögel, bleiben bis Juli
Lachmöwe	Mittel-/Westeuropa	**250.000**	die meisten bleiben zur Brut
Sturmmöwe	Mittel- und Westeuropa	**50.000**	kommen zu ca. 100.000 Überwinterern dazu
Heringsmöwe	Küsten Westafrika und Südwesteuropa	**160.000**	bleiben bis September und brüten
April			
Seeregenpfeifer	Nordwestafrika, westliches Mittelmeer	**700**	bis September; fast alle bleiben zur Brut
Kiebitzregenpfeifer	Westafrika	**100.000**	bis Mai
Kampfläufer	Tropisches Afrika, Westeuropa	**3.000**	bis Mai; meist in Feuchtgebieten binnendeichs
Isländische Uferschnepfe	Marokko, Südwesteuropa	**500**	bis Mai
Pfuhlschnepfe	Westafrika	**300.000**	zum Teil bis Ende Mai
Regenbrachvogel	Westafrika	**3.000**	bis Mitte Mai
Dunkler Wasserläufer	Tropisches Afrika	**10.000**	nur kurze Rast von Ende April bis Mitte Mai
Rotschenkel	Westafrika, Westeuropa	**35.000**	bis Mai
Grünschenkel	Tropisches Afrika	**10.000**	bis Anfang Mai
Steinwälzer	Küsten Westafrika, Westeuropa	**10.000**	bis Ende Mai
Brandseeschwalbe	Küste Westafrika	**40.000**	die meisten brüten im Wattenmeer
Flussseeschwalbe	Küste Westafrika	**35.000**	die meisten brüten im Wattenmeer
Küstenseeschwalbe	Westafrikanische bis antarktische Küsten	**20.000**	die meisten brüten im Wattenmeer
Zwergseeschwalbe	Küste Westafrika	**2.500**	die meisten brüten im Wattenmeer

Art *Species*	aus Richtung *from Direction*	Anzahl *Number*	Aufenthalt *Stop-over*
Mai			
Sandregenpfeifer	Küste Westafrika	**35.000**	bis Ende Mai/Anfang Juni
Knutt	Küste Westafrika	**400.000**	bis Ende Mai, teils bis Anfang Juni (sibirische Population)
Sanderling	Atlantikküste von Westeuropa bis Südafrika	**50.000**	bis Ende Mai/Anfang Juni
Zwergstrandläufer	Westafrika, Südwesteuropa	**1.000**	Mitte Mai; meist auf Brackwasserwatten
Sichelstrandläufer	Westafrika, Südwesteuropa	**2.000**	Mitte Mai; meist auf Brackwasserwatten
Sumpfläufer	Nordafrika, Südeuropa	**300**	Mitte Mai; meist auf Brackwasserwatten
Lachseeschwalbe	Küste Westafrika	**80**	brüten fast alle in nur einer Brutkolonie im Wattenmeer
Juni			
Brandgans	Nordwesteuropa	**250.000**	suchen Mausergebiet vor allem im Dithmarscher Wattenmeer auf; bis September
Kampfläufer	Nordsibirien, Nordskandinavien	**5.000**	bis Oktober; einige kommen noch im Juli
Großer Brachvogel	Nordwestrussland, Skandinavien	**250.000**	bis Oktober
Dunkler Wasserläufer	Nordwestrussland, Skandinavien	**20.000**	bis September
Juli			
Kormoran	Nord- und Osteuropa	**25.000**	bis Oktober
Eiderente	Ostsee	**250.000**	mausern im Wattenmeer, viele überwintern dort auch
Austernfischer	Weißes Meer, Skandinavien	**400.000**	ab Ende Juli; von August bis Oktober höchste Bestände im Wattenmeer
Säbelschnäbler	Ostsee	**1.500**	bis September
Sandregenpfeifer	Nordskandinavien, Nordrussland, Island, Grönland	**38.000**	bis September
Kiebitz	Ost- und Nordeuropa	**220.000**	bis Herbst; Mauserzug nach der Brutzeit
Knutt	Nordsibirien, Grönland, Nordostkanada	**850.000**	sibirische Knutts bis August, grönländisch/kanadische Knutts bis Oktober
Sanderling	Grönland, Nordostkanada, Nordsibirien	**30.000**	bis August/September; Jungvögel kommen ab Mitte August
Zwergstrandläufer	Nordskandinavien, Nordwestrussland	**1.000**	im Juli für wenige Wochen (Altvögel)
Sichelstrandläufer	Nordsibirien	**15.000**	bis August; Jungvögel kommen ab Mitte August
Alpenstrandläufer	Nordsibirien bis Nordskandinavien	**1.200.000**	bis Herbst; Altvögel mausern, Jungvögel kommen ab August
Sumpfläufer	Nordwestrussland, Nordskandinavien	**100**	Altvögel; bis Ende Juli
Bekassine	Nordeuropa	**mehrere 100.000**	bis Herbst; gut versteckt, nur wenige sind sichtbar
Pfuhlschnepfe	Nordskandinavien, Nordwestrussland	**125.000**	bis Herbst; ein Teil überwintert
	Nordsibirien	**350.000**	bis August
Regenbrachvogel	Skandinavien, Nordwestrussland	**5.000**	bis August
Rotschenkel	Skandinavien, Nordwestrussland, Island	**70.000**	bis August/September; ca. 25.000 aus Island überwintern im Wattenmeer
Grünschenkel	Skandinavien	**30.000**	bis September
Steinwälzer	Grönland, Nordostkanada, Skandinavien, Nordwestrussland	**12.000**	bis Oktober; ein Teil nur bis August und dann Weiterflug bis Westafrika
Lachmöwe	Nord-/Osteuropa	**200.000**	bis Oktober; Zuzug aus den nördlichen Brutgebieten
Sturmmöwe	Ostseegebiet, Südskandinavien	**180.000**	bis November; kommen zu den Brutvögeln im Wattenmeer dazu
Silbermöwe	Ostsee, Skandinavien	**30.000**	bis November
Mantelmöwe	Ostsee, Skandinavien, Nordatlantik	**12.000**	bis November
August			
Pfeifente	Nordwestsibirien bis Nordwesteuropa	**330.000**	teils bis November; viele überwintern im Wattenmeer
Krickente	Nordrussland, Skandinavien, Ostsee	**45.000**	bis November
Spießente	Nordwestsibirien, Nordrussland, Skandinavien	**32.000**	bis November
Löffelente	Nord- und Osteuropa	**5.500**	bis November
Goldregenpfeifer	Nordrussland, Skandinavien	**120.000**	bis Dezember (Höchstzahl im Oktober)
Kiebitzregenpfeifer	Nordsibirien, Nordwestrussland	**100.000**	bis September
Zwergstrandläufer	Nordskandinavien, Nordwestrussland	**2.000**	Jungvögel; bis September
Sumpfläufer	Nordwestrussland, Nordskandinavien	**100**	Jungvögel
September			
Nonnengans	Ostsee	**20.000**	bis Oktober/November
Dunkelbäuchige Ringelgans	Nordsibirien (Taimyr)	**85.000**	bis Ende Oktober
Isländische Uferschnepfe	Island, Südwestnorwegen	**500**	einige schon ab Juli; bis November
Oktober			
Kurzschnabelgans	Spitzbergen	**15.000**	bis November; vorwiegend im dänischen Wattenmeer
Nonnengans	Nordwestrussland	**300.000**	teils bis November; viele überwintern im Wattenmeer

Dargestellt ist ein großer Teil der Wat- und Wasservogelarten, die im Laufe eines Jahres das Wattenmeer zur Rast entlang ihres Ostatlantischen Zugweges nutzen. Die Zahlen beziehen sich auf das gesamte Wattenmeer von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden und leiten sich aus dem „Trilateralen Monitoring- und Erfassungsprogramm" der drei Staaten ab. Sie beschreiben die Anzahl der ankommenden und abfliegenden Vögel nur grob, denn oft erfolgt die Ankunft oder der Abflug über mehr als einen Monat, es sind verschiedene Populationen betroffen, und die Zahlen verändern sich von Jahr zu Jahr. Diese Zunahmen, Abnahmen oder Schwankungen können natürliche Gründe haben oder auch durch den Menschen beeinflusst sein. Sie können im Brutgebiet, auf dem Zug, im Wattenmeer oder im Überwinterungsgebiet ansetzen.

© WWF Deutschland, Berlin
Kontakt: WWF Wattenmeerbüro, husum@wwf.de, www.wwf.de/watt bzw. www.wwf.de/watt/voegel
1. Auflage, Oktober 2016
Gedruckt auf 100% Recycling-Papier
Layout: Liebmann Feine Grafik, Lübeck
Gefördert von:

Frühjahrszug | Herbstzug

Abflug *Departure* Wattenmeer

Art *Species*	in Richtung *to Destination*	Anzahl *Number*	Hinweise *Notes*
Februar			
Kurzschnabelgans	Spitzbergen	**15.000**	Zwischenrast in Norwegen
Brandgans	Nordwesteuropa	**180.000**	Winterbestand, Abzug bis März; 6.500 Paare bleiben zur Brut im Wattenmeer
Eiderente	Ostsee	**180.000**	Winterbestand, Abzug Februar bis März; 10.000 Paare bleiben zur Brut
März			
Pfeifente	Nordwesteuropa bis Nordwestsibirien	**250.000**	Winterbestand; zieht bis Ende März ab
Austernfischer	Südskandinavien, Ostsee	**300.000**	Winterbestand; ein Teil zieht Anfang März ab
Kiebitz	Nordeuropa	**35.000**	viele weitere brüten im Wattenmeer
Sturmmöwe	Skandinavien, Ostsee	**100.000**	viele weitere brüten im Wattenmeer
Silbermöwe	Skandinavien, Ostsee	**20.000**	ca. 80.000 Paare brüten im Wattenmeer
April			
Kormoran	Nord- und Osteuropa	**5.000**	
Nonnengans	Ostsee	**20.000**	Anfang bis Mitte April
Krickente	Skandinavien, Nordrussland, Ostsee	**18.000**	
Spießente	Skandinavien bis Nordwestsibirien	**22.000**	wenige übersommern im Wattenmeer
Löffelente	Nord- und Osteuropa	**1.500**	
Austernfischer	Skandinavien, Weißes Meer	**100.000**	Abzug Ende April bis Ende Mai; 40.000 Paare brüten im Wattenmeer
Säbelschnäbler	Ostsee	**1.500**	
Sandregenpfeifer	Nördliches Europa	**3.000**	
Kiebitzregenpfeifer	Nordwestrussland	**30.000**	
Großer Brachvogel	Skandinavien, Nordwestrussland	**250.000**	Abzug ca. 10.–25. April
Rotschenkel	Island	**25.000**	

Art *Species*	in Richtung *to Destination*	Anzahl *Number*	Hinweise *Notes*
Mai			
Nonnengans	Nordwestrussland	**350.000**	
Dunkelbäuchige Ringelgans	Nordsibirien (Taimyr)	**225.000**	Abflug ca. 20.–25. Mai, mit Zwischenstopp am Weißen Meer
Sandregenpfeifer	Nordskandinavien, Nordrussland, Island, Grönland	**35.000**	Abzug Ende Mai/Anfang Juni
Goldregenpfeifer	Skandinavien und Nordrussland	**85.000**	Anfang Mai ziehen alle ab
Kiebitzregenpfeifer	Nordwestrussland bis Nordsibirien	**150.000**	Abzug Mitte bis Ende Mai
Knutt	Grönland, Nordostkanada	**450.000**	Anfang Mai Weiterflug über Island und Norwegen ins Brutgebiet
	Nordsibirien	**400.000**	Ende Mai/Anfang Juni Weiterflug ins Brutgebiet
Sanderling	Grönland, Nordostkanada, Nordsibirien	**60.000**	zum Teil Abzug erst Anfang Juni
Zwergstrandläufer	Nordskandinavien, Nordwestrussland	**1.000**	
Sichelstrandläufer	Nordsibirien	**2.000**	
Alpenstrandläufer	Nordskandinavien bis Nordsibirien	**1.000.000**	je nordöstlicher das Brutgebiet desto später der Abzug im Mai
Sumpfläufer	Nordwestrussland, Nordskandinavien	**300**	
Kampfläufer	Skandinavien bis Nordsibirien	**3.000**	
Isländische Uferschnepfe	Island, Südwestnorwegen	**500**	
Pfuhlschnepfe	Nordskandinavien, Nordwestrussland	**125.000**	Anfang Mai
	Nordsibirien	**350.000**	Ende Mai; bis 10.000 übersommern
Regenbrachvogel	Skandinavien, Nordwestrussland	**3.000**	Anfang Mai
Dunkler Wasserläufer	Skandinavien, Nordwestrussland	**10.000**	letzter Abzug ca. bis 15. Mai
Rotschenkel	Skandinavien, Nordwestrussland	**35.000**	bis Ende Mai; je nördlicher das Brutgebiet, desto später der Abzug
Grünschenkel	Skandinavien	**10.000**	
Steinwälzer	Grönland, Nordostkanada, Skandinavien, Nordwestrussland	**10.000**	erste Maihälfte; einige bleiben bis Ende Mai
Juli			
Sumpfläufer	Mittelmeerküste, Nordafrika	**100**	Altvögel
Uferschnepfe	Westafrika, Südwesteuropa	**6.000**	Westeuropäische Population stark abnehmend
Rotschenkel	Westafrika	**40.000**	Abzug der lokalen Brutvögel
Brandseeschwalbe	Küste Westafrika	**40.000**	einige bleiben bis September
Flussseeschwalbe	Küste Westafrika	**35.000**	
Küstenseeschwalbe	Westafrikanische bis antarktische Küsten	**20.000**	
August			
Knutt	Küste Westafrika	**400.000**	Ende August
Sanderling	Küsten West- bis Südafrika	**30.000**	Jungvögel ziehen später ab; einige Vögel überwintern auch
Zwergstrandläufer	Südwesteuropa, Westafrika	**1.000**	Abzug der Altvögel
Sichelstrandläufer	Südwesteuropa, Westafrika	**20.000**	Abzug der Altvögel; im September ziehen die Jungvögel ab
Sumpfläufer	Mittelmeerküste, Nordafrika	**100**	Jungvögel
Pfuhlschnepfe	Westafrika	**360.000**	
Regenbrachvogel	Westafrika	**5.000**	
Lachseeschwalbe	Küste Westafrika	**100**	
Zwergseeschwalbe	Küste Westafrika	**2.500**	
September			
Löffler	Südwesteuropa, Westafrika	**7.500**	
Brandgans	Nordwesteuropa	**50.000**	verteilen sich aus dem Mausergebiet; 200.000 überwintern im Wattenmeer
Eiderente	Ostsee	**70.000**	nach der Mauser
Säbelschnäbler	Portugal, Westfrankreich	**21.500**	einige Tausend bleiben in milden Wintern an der niederländischen Küste
Sandregenpfeifer	Süd-/Südwesteuropa, Nord-/Westafrika	**40.000**	
Seeregenpfeifer	Nordwestafrika, westliches Mittelmeer	**800**	
Kiebitzregenpfeifer	Atlantikküste bis Westafrika	**100.000**	in milden Wintern bleiben bis 50.000 im Wattenmeer
Zwergstrandläufer	Südwesteuropa, Westafrika	**2.000**	Abzug der Jungvögel
Dunkler Wasserläufer	Tropisches Afrika	**20.000**	einige bis November
Rotschenkel	Westafrika, Mittelmeer, Westeuropa	**45.000**	weitere 25.000 überwintern im Wattenmeer
Grünschenkel	Britische Inseln, westliches Mittelmeer, Westafrika	**30.000**	
Heringsmöwe	Küsten Westafrika und Südwesteuropa	**200.000**	
Oktober			
Kormoran	Mittel- und Westeuropa	**30.000**	wenige überwintern im Wattenmeer
Dunkelbäuchige Ringelgans	Küsten Südengland, Niederlande, Frankreich	**75.000**	10.000 überwintern im Wattenmeer
Austernfischer	Westeuropa	**einige 10.000**	ca. 500.000 überwintern im Wattenmeer
Knutt	Westeuropa	**450.000**	bis 150.000 können in milden Wintern im Wattenmeer bleiben
Sanderling	Atlantikküste von West- bis Südeuropa	**5.000**	wenige tausend überwintern im Wattenmeer

Art *Species*	in Richtung *to Destination*	Anzahl *Number*	Hinweise *Notes*
Alpenstrandläufer	Küsten Westeuropa bis Nordafrika	**1.200.000**	in milden Wintern bleibt ein Teil im Wattenmeer
Kampfläufer	Tropisches Afrika	**5.000**	
Bekassine	Tropisches Afrika	**mehrere 100.000**	
Großer Brachvogel	Westeuropa	**80.000**	ca. 250.000 überwintern im Wattenmeer
Steinwälzer	Nordwesteuropa (v.a. Britische Inseln)	**12.000**	ca. 8.000 überwintern im Wattenmeer
Lachmöwe	Mittel-/Westeuropa	**450.000**	ca. 50.000 überwintern im Wattenmeer
November			
Kurzschnabelgans	Niederlande, Belgien	**15.000**	
Nonnengans	Niederlande (Binnenland)	**150.000**	ca. 150.000 überwintern im Wattenmeer
Pfeifente	Küsten Westeuropa	**80.000**	in milden Wintern bleiben über 250.000 im Wattenmeer
Krickente	Westeuropa	**45.000**	
Spießente	Westeuropa, Mittelmeer, Westafrika	**32.000**	in milden Wintern bleiben fast 30.000 im Wattenmeer
Löffelente	Südwesteuropa, Westafrika	**8.000**	
Kiebitz	Westeuropa	**220.000**	stetiger Abzug; bei mildem Wetter bleiben einige 10.000 bis Dezember
Isländische Uferschnepfe	Südwesteuropa, Marokko	**500**	bleiben oft bis zum ersten Frost
Pfuhlschnepfe	Westeuropa	**45.000**	bis 80.000 überwintern im Wattenmeer
Sturmmöwe	Mittel- und Westeuropa	**130.000**	über 100.000 überwintern im Wattenmeer
Silbermöwe	Mittel- und Westeuropa	**30.000**	über 150.000 überwintern im Wattenmeer
Mantelmöwe	Mittel- und Westeuropa	**12.000**	ca. 10.000 überwintern im Wattenmeer
Dezember			
Goldregenpfeifer	Atlantikküste Südwesteuropa	**90.000**	in milden Wintern bleiben bis 30.000 im Wattenmeer

Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Das Wattenmeer Welterbe seit 2009

WATTENMEER WELTNATURERBE

Nationalpark Wattenmeer

Naturschutzgesellschaft Schutzstation Wattenmeer e.V.

IWSS

WWF

Nationalpark und Weltnaturerbe Wattenmeer: Der „Bahnhof" der Küstenvögel auf dem Ostatlantischen Zugweg